




მეტკოპერი მოქმედი ნივთიერების უნიკალური კომბინაციის მქონე სისტემურ კონტაქტური ფუნგიციდია, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში გავრცელებული მრავალი პრობლემური სოკოვანი დაავადების წინააღმდეგ გამოიყენება.

# მეტკოპერი

სპილენძის ქლორჟანგი 420გ/კგ  
+მეტალაქსილი 80გ/კგ

## რა თვისებები ახასიათებს მეტკოპერს?

- მეტკოპერის მოქმედი ნივთიერება მეტალაქსილი ტრანსლამინალური და სისტემური მოქმედებით უზრუნველყოფს მცენარის შიგნიდან დაცვას;
- სპილენძის ქლორჟანგის და მეტალაქსილის უნიკალური კომბინაცია ეფექტურად იცავს მცენარეს, როგორც გარედან (დაცვითი ბარიერი), ისე ქსოვილის შიგნით (სამკურნალო თვისება).
- არ გააჩნია ფიტოტოქსიკურობის თვისება;
- დაავადების მიმართ რეზისტენტობა გამორიცხულია;
- მეტკოპერი თავსებადია უამრავ პერბიციდთან, რომელსაც გააჩნია ნეიტრალური ქიმიური რეაქცია;
- დაცვითი ხანგრძლივობა 8-10 დღე დასაცავი კულტურისა და ინფექციური დატვირთვის გათვალისწინებით;
- მეტკოპერი განსაკუთრებით ეფექტურია პროფილაქტიკური გამოყენების შემთხვევაში;



## როგორ გამოვიყენოთ მეტი ეფექტისთვის?

დაავადების უკეთ კონტროლის მიზნით უმჯობესია მეტკოპერი გამოიყენოთ პროფილაქტიკური მიზნებისთვის; რეზისტენტობის თავიდან ასაცილებლად დაიცავით ხარჯვის ნორმები. პრეპარატის კომბინირება შესაძლებელია მრავალ ინსექტიციდთან, აკარიციდთან და ფუნგიციდთან, რაც მისი გამოყენების შესაძლებლობებს ზრდის. ტოქსიკურობის კლასი III.



# რომელი კულტურებისთვის გამოვიყენოთ?

| კულტურა                  | დაავადება                                                                                                                                                | ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა | გამოყენება                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| ვაზი                     | ჭრაქი (მილდიუ) ( <i>Plasmopara viticola</i> )                                                                                                            | 2.5                 | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20 (4) |
| კარტოფილი                | ფიტოფტორა ( <i>Phytophthora infestans</i> ),<br>ალტერნარიოზი ( <i>Alternaria solani</i> )                                                                | 2.5                 | 20 (3)                               |
| ხახვი                    | პერენოსპოროზი ( <i>Peronospora destructor</i> )                                                                                                          | 2.5                 | 20 (3)                               |
| კიტრი                    | პერენოსპოროზი ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )                                                                                                      | 2.5                 | 20 (3)                               |
| პომიდორი<br>(ღია გრუნტი) | ფიტოფტორა ( <i>Phytophthora infestans</i> (Mont.),<br>ალტერნარიოზი ( <i>Alternaria solani</i> )                                                          | 2.5                 | 10 (4)                               |
| ვაშლი                    | ქეცი ( <i>Venturia inaequalis</i> Wint.)                                                                                                                 | 4                   | 20 (4)                               |
| საბამთრო,<br>ნესვი       | საბამთროს ჭრაქი - პერენოსპოროზი<br>( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ), ნესვის<br>პერენოსპოროზი ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> Dc)                    | 2.5                 | 20 (3)                               |
| ციტრუსი                  | ციტრუსის ფოთლებისა და ღეროების მელანოზი<br>( <i>Melanose</i> ), მუნი მღერი ( <i>Scab</i> ), ანთრაქნოზი<br>( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> Penz.) | 3                   | 10 (4)                               |
| თხილი,<br>კაკალი         | სიდამპლე ( <i>Broun rot</i> )                                                                                                                            | 6-7                 | 10 (4)                               |

