

აკბატი

მანკოცები 600გ/კგ + დიმეტომორფი 90გ/კგ



www.agronom.com.ge



აგრონომი • Agronom



ბიძინა კვერნაძის ქ.35



აგრონომი

მანკოცები 600გ/კგ + დიმეტომორფი 90გ/კგ



აკბატი კონტაქტურ-სისტემური მოქმედების კომბინირებული ფუნგიცია ვაზის, ბოსტნეული კულტურების, კარტოფილისა და სხვა ტექნიკური კულტურების ჭრაქოვანი დაავადებებისგან დასაცავად.

რა თვისებებით ხასიათდება აკბატი?

- პრეპარატია თავსებადია სტანდარტულ ინსექტიციდებთან, აკარიციდებთან და ფუნგიციდებთან;
- შესხურებებს შორის ინტერვალი 10-14 დღე, კლიმატური პირობების გათვალისწინებით;
- ტოქსიკურობის კლასი II;
- სწრაფად იჭრება მცენარეში და თანაბრად ნაწილდება მასში;
- გამოირჩევა განსაკუთრებული სელექტიურობით;
- შესხურებიდან 2 საათის შემდგომ მოსული ნალექი პრეპარატის ეფექტურობაზე გავლენას ვერ ახდენს;
- აკბატის კომბინირება დასაშვებია სხვა ფუნგიციდებთან და ინსექტოაკარიციდებთან;

კულტურა	დაავადება	ხარჯვის ნორმა	ლოდინის პერიოდი
ვაზი	ჭრაქი	2	40(3)
კარტოფილი	ფიტოფტორა, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი	2-2.5	20(3)
კიტრი (სათესლე ნაკვეთები)	პერენოსპორიოზი	2	-(5)
პომიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)	ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი	2	40(3)
კიტრი (ღია გრუნტი)	პერენოსპორიოზი	2	15(3)
ხახვი	პერენოსპორიოზი	2	15(3)
თამბაქო	პერენოსპორიოზი	2-2.5	20(3)

